На правах рукописи

АТАПИНА НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА

**АНТИАГРЕГАНТНАЯ, АНТИТРОМБОТИЧЕСКАЯ И
ЦЕРЕБРОПРОТЕКТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ НОВЫХ
ПРОИЗВОДНЫХ ГИДРОКСИБЕНЗОЙНЫХ КИСЛОТ**

3.3.6. Фармакология, клиническая фармакология

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата фармацевтических наук

Волгоград, 2022

Работа выполнена в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации»

Научный руководитель:

доктор фармацевтических наук,
доцент

Куркин Денис Владимирович

Научный консультант:

доктор химических наук,
профессор

Брель Анатолий Кузьмич

Официальные оппоненты:

Заведующий кафедрой фармацевтической химии, фармакогнозии и организации фармацевтического дела факультета фундаментальной медицины ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», доктор фармацевтических наук,
профессор

Каленикова Елена Игоревна

заведующий лабораторией фармакологии цереброваскулярных расстройств ФГБНУ НИИ фармакологии имени В.В. Закусова» Заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук,
профессор

Мирзоян Рубен Симонович

Ведущая организация:

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук» (Томский НИМЦ) 634009. г. Томск, пер. Кооперативный 5.

Защита диссертации состоится «_____» _____ 2022 г. в _____ ч. на заседании Диссертационного Совета 21.2.005.02 ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации по адресу 400131, г. Волгоград, пл. Павших Борцов, 1.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте (www.volgmed.ru) ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России

Автореферат разослан «_____» _____ 2022 г.

Ученый секретарь
Диссертационного Совета,
доктор биологических наук

Любовь Ивановна Бугаева

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Одним из патогенетических звеньев сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний является тромбообразование. В пожилом и старческом возрасте частота тромбозов увеличивается в несколько раз и достигает 200 случаев на 100 000 тыс. человек в год (Чазов Е.И., 2008; Мирзоян Р.С. и др., 2009; Спасов А.А. и др., 2013; Дедов И.И., 2013, 2015). С каждым годом число пациентов с сосудистыми поражениями постоянно увеличивается, так, в экономически развитых странах ежегодно отмечается около 1 млн. случаев ишемического инсульта (ИИ), а к 2030 году прогнозируется увеличение данного показателя до 3,4 млн. (Roger V.L. et al., 2011; Virani S.S. et al., 2021). Сахарный диабет (СД) является одним из основных факторов риска, способствующих формированию тромбов. В России по состоянию на начало 2021 года насчитывалось свыше 4,7 млн., а в мире (по данным IDF) более 530 млн. людей с СД (Дедов И.И. и др., 2021). Таким образом, разработка новых соединений проявляющих антиагрегантную активность в ряду производных гидроксibenзойных кислот является актуальным.

Тема диссертации утверждена Ученым Советом ВолгГМУ (15. 01. 2020г., протокол № 5) и включена в план НИР.

Степень разработанности. Ключевая роль в процессах тромбообразования принадлежит тромбоцитам. Адгезия, активация и синтез тромбоксана А₂ являются основными стадиями образования тромба (Зиганшин А.У. 2017; Swieringa F. et al., 2017). Стимуляция процесса тромбообразования заключается во взаимодействии тромбоцитов с эндогенными проагрегирующими веществами и молекулами. (Кубатиев А.А. и др., 2016; Ghasemzadeh M. et al., 2018).

Широкое применение существующих антиагрегантов, таких как аспирин, клопидогрел, прасугрел и тикагрелор, и антагонистов гликопротеина П₂/П₃, ограничено из-за повышенного риска кровотечений и устойчивости к антитромбоцитарным препаратам. Следовательно,

целесообразны дальнейшие поиски эффективных и безопасных антитромбоцитарных препаратов (Ostrowska, M. et al., 2019; Rengasamy K.R.R. et al., 2019).

В поиске новых антиагрегантных препаратов активно принимают участие химики и фармакологи исследовательских лабораторий всего мира. Дериватизация молекулы гидроксibenзойных кислот путём присоединения к ней различных заместителей позволяет сохранить исходный механизм действия, изменить физико-химические свойства и добавить ряд плейотропных эффектов (Брель А.К., Лисина С.В., Будаева Ю.Н., 2021; Патент РФ № RU 2632005 С1).

Цель исследования. Провести поиск ингибиторов агрегации тромбоцитов среди новых производных гидроксibenзойных кислот в ряду замещённых амидов и их солевых форм, исследовать их антитромбогенную и церебропротективную активность.

Задачи исследования:

1. Выполнить поиск соединений, проявляющих высокую антиагрегантную активность *in vitro* в ряду новых производных гидроксibenзойных кислот.
2. Оценить антиагрегантную активность соединений *in vivo* в ряду новых производных гидроксibenзойных кислот и определить параметры острой токсичности для наиболее активных соединений.
3. Исследовать антитромботическое действие наиболее активных соединений.
4. Изучить действие наиболее активных соединений на тромбогенный потенциал крови, антитромботическую активность и продолжительность кровотечения у животных с преморбидным фоном.
5. Для соединения лидера провести оценку церебропротекторного эффекта при моделировании острого или хронического нарушения мозгового кровообращения.
6. Оценить выраженность влияния соединения лидера на показатели гемостаза у животных с хроническим нарушением мозгового кровообращения.

Научная новизна исследования. В ряду новых производных гидроксibenзойных кислот впервые проведен целенаправленный поиск соединений, оказывающих влияние на процессы агрегации тромбоцитов, эндотелио- и церебропротективное действие.

По результатам выполненных исследований было выявлено вещество С-60, которое по совокупности тестов было признано наиболее активным и малотоксичным. Также было проанализировано его влияние на сосудисто-тромбоцитарный гемостаз *in vitro* и *in vivo*, в результате – получены данные, подтверждающие наличие у него выраженных антиагрегантных свойств. Впервые, на моделях тромбоза сонной артерии крыс, индуцированного нанесением на поверхность сосуда хлорида железа (III) или воздействием электрического тока, при СД, острых и хронических нарушениях мозгового кровообращения, доказаны антитромботические свойства этого соединения. Впервые проведен анализ его церебропротективных эффектов.

Теоретическая и практическая значимость работы. В настоящем исследовании экспериментально доказано, что изучение и разработка новых производных гидроксibenзойных кислот имеют перспективу для создания на их основе антиагрегантных и антитромботических средств, которые обладают дополнительным эндотелио- и церебропротекторным действием. Выявлено наиболее активное вещество под лабораторным шифром С-60, на основе экспериментальных данных установлены оптимальные дозы, в которых данное соединение оказывало антиагрегантное, антитромботическое и церебропротективное действие. Получены новые данные об антитромботических свойствах исследуемого соединения С-60 на экспериментальных моделях тромбозов, широко распространённых в доклинических исследованиях (индуцированных FeCl_3 или электрическим током), у различных групп животных (здоровые, с экспериментальным сахарным диабетом или старе). Соединение С-60 в меньшей

степени чем ацетилсалициловая кислота (АСК) влияло на продолжительность кровотечения. Исследование церебропротективной активности соединения С-60 позволило установить, что оно в более низкой дозе, чем АСК, проявляет сопоставимое церебропротективное и эндотелиопротективное действие у животных с острыми или хроническими формами нарушений мозгового кровообращения.

Методология и методы исследования. Эксперименты выполняли, стремясь максимально разносторонне оценить спектр фармакологической активности исследуемых производных гидроксibenзойных кислот. Исследования выполнены в соответствии с «Руководством по проведению доклинических исследований лекарственных средств» (Миронов А.Н. и др., 2012). Соблюдали этические нормы при работе с модельными организмами, в соответствии с принципом «3R» выбирали валидные экспериментальные модели, минимально возможное количество животных. Заключение и выводы основаны на результатах исследований, выполненных автором, составлены и интерпретированы с учётом данных, изложенных в научной литературе.

Основные положения, выносимые на защиту.

1. В ряду новых производных гидроксibenзойных кислот выявлены соединения С-10 (натриевая соль 4-ацетоксибензоиламиноксусной кислоты), С-24 (дикалиевая соль N-салицилоилглицина), С-60 (дикалиевая соль N-(3-оксибензоил)таурина), С-61 (дикалиевая соль N-(4-оксибензоил)таурина) с выраженной антиагрегантной активностью. Наиболее активное соединение С-60 обладало антиагрегантной и антитромботической активностями как у животных без патологии, так и у животных с преморбидным фоном (возраст или СД), что делает его перспективным для дальнейшего изучения.

2. Соединение С-60 проявляет дополнительные плеiotропные эффекты, включающие церебропротективное и эндотелиопротективное действие, обладает низкой токсичностью и потенциально высокой лекарственной

безопасностью. Не вызывает изменений функционального состояния нервной системы и поведенческих реакций, что указывает на перспективность его дальнейшего изучения с целью возможного внедрения в клиническую практику в качестве антиагрегантного препарата, в том числе в условиях острого или хронического нарушения мозгового кровообращения.

Степень достоверности. Степень достоверности полученных результатов подтверждается достаточным количеством экспериментов *in vitro* и *in vivo*, выполненных на необходимом числе модельных организмов (крысах и мышах обоего пола) или образцах плазмы, а также применением адекватных методов статистической обработки получаемых данных. При выполнении работы применяли современные методы, оборудование; обязательным было применение СОПов (Стандартные операционные процедуры).

Личный вклад автора. Автор лично выбирал направление исследований, планировал и проводил эксперименты, анализировал, интерпретировал и оформлял результаты, писал статьи и курировал их публикации в научных журналах. Автор исследования принимал ключевое участие в реализации всех этапов – от постановки задач и разработки протоколов исследования, выполнения экспериментальных работ, анализа и интерпретации полученных данных, до их представления в виде научных отчетов, публичных выступлений с докладами и публикаций в рецензируемых изданиях.

Апробация полученных результатов. Основные результаты диссертационного исследования публично представлялись на научно-практических конференциях: 73-,75-,78-ой открытой научно-практической конференции молодых учёных и студентов с международным участием «Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины» (Волгоград, 2015, 2017, 2021); XXIV Региональной конференции молодых ученых и исследователей Волгоградской области (Волгоград, 2019).

По материалам работы опубликовано 20 научных работ, 5 из которых размещены в изданиях перечня рецензируемых ВАК Министерства образования и науки РФ, 2 патента РФ.

Структура и объем диссертации. Текст диссертационной работы изложен на 141 странице машинописного текста, разделён на: введение, обзор литературы, описание материалов и методов исследования, 4 главы собственных исследований, обсуждение результатов, выводы, научно-практические рекомендации, список литературы (218 источников, из них 64 российских и 154 зарубежных), перечень условных сокращений, иллюстрации представлены 34 рисунками, результаты также отражены в 7 таблицах.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе проведен анализ отечественных и зарубежных литературных источников по теме диссертации. Представлены группы антиагрегантных препаратов, для клинического применения. Рассмотрены современные взгляды на проблему тромбообразования и основные механизмы и системы, лежащие в основе развития данных процессов. Сформулирована концепция исследования.

Во второй главе представлены материалы и методы исследований. Исследование проводили на 14-ти новых производных гидроксibenзойных кислот под лабораторным шифром «С», которые условно разделили на 4 группы согласно химической структуре с различными радикалами: производные с ГАМК, глицином, морфолином и таурином. Соединения были синтезированы под руководством заведующего кафедрой химии ВоГГМУ д.х.н. проф. А.К. Бреля, к.х.н. Ю.Н. Будаевой. Структурные формулы изученных соединений представлены ниже (Таблица 1).

В качестве модельных организмов использовали крыс (*Wistar*) и беспородных мышей. Животных закупали в специализированных питомниках, а затем содержали в условиях стандартного вивария. Выполнение экспериментов регламентировалось методическим руководством и нормативным документа: ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009, ГОСТ

Р ИСО 5725-2002, правила лабораторной практики при проведении доклинических исследований в РФ в соответствии с «Принципами надлежащей лабораторной практики» (ГОСТ Р 33044-2014, 2015), и решением Совета ЕЭК №81 от 03.11.16 «Об утверждении Правил надлежащей лабораторной практики Евразийского экономического союза в сфере обращения лекарственных средств»; Директива 2010/63/EU Европейского парламента и Совета Европейского Союза от 22.09.2010 г. по охране животных, используемых в научных целях.

Дизайн исследования (Рисунок 1): на первом этапе проводили скрининговое исследование *in vitro* 14 новых производных гидроксibenзойных кислот. На следующем этапе в соответствии с уровнем антиагрегантной активности, было выявлено соединение лидер (С-60), определяли его острую токсичность и терапевтический потенциал. После чего провели комплекс исследований по определению антитромбогенной активности.

Учитывая плейотропные свойства АСК, провели исследования влияния соединения С-60 на психоневрологическое состояние, мозговое кровообращение и эндотелиальную функцию животных с ОНМК или ХНМК.

Возможные механизмы антиагрегантного действия соединения С-60, а именно его влияние на основные показатели коагуляционного гемостаза, вазодилатирующую функцию эндотелия и его простациклин-синтезирующую активность по реакции пилальных сосудов на индометацин изучались на завершающем этапе.

Статистическую обработку результатов проводили, учитывая характер полученных данных, в соответствии с которым применяли параметрические и непараметрические критерии.

Таблица 1. Структурные формулы производных гидроксibenзойных кислот

	шифр соединения	R ₁	R ₂
Производные гидроксibenзойных кислот и ГАМК
<p>Chemical structure: A benzamide ring with a substituent R₁ at the para position. The amide nitrogen is attached to a propyl chain (CH₂)₃, which is further attached to a carbonyl group (C=O) with a substituent R₂.</p>	C-18	3-OH	OH
	C-50	4-Ac	OLi
Производные гидроксibenзойных кислот и глицин
<p>Chemical structure: A benzamide ring with a substituent R₁ at the para position. The amide nitrogen is attached to a methylene group (CH₂), which is further attached to a carbonyl group (C=O) with a substituent R₂.</p>	C-9	2-ONa	ONa
	C-10	4-Ac	ONa
	C-24	2-OK	OK
	C-40	4-Ac	OK
Производные гидроксibenзойных кислот и морфолин
<p>Chemical structure: A benzamide ring with a substituent R₁ at the para position. The amide nitrogen is attached to a morpholine ring.</p>	C-14	4-OLi	-
	C-16	2-OK	-
Производные гидроксibenзойных кислот и таурин
<p>Chemical structure: A benzamide ring with a substituent R₁ at the para position. The amide nitrogen is attached to a dimethylsulfonamide group (CH₂)₂-S(=O)₂-R₂.</p>	C-56	2-OLi	OLi
	C-57	3-OLi	OLi
	C-58	4-OLi	OLi
	C-59	2-OK	OK
	C-60	3-OK	OK
	C-61	4-OK	OK

Рисунок 1. Дизайн исследования

В третьей главе представлены результаты поэтапного скринингового исследования. На первом этапе исследования проводили анализ антиагрегантной активности *in vitro* 14 новых производных гидроксibenзойных кислот и препарата сравнения АСК в диапазоне концентраций от 10^{-4} до 10^{-8} М. Все вещества оказали дозозависимое антиагрегантное действие (Рисунок 2). Наибольшую антиагрегантную активность проявили соединения под лабораторными шифрами: С-10, С-24, С-60, С-61.

Терапевтический индекс соединений определяли у здоровых животных на модели АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов. Исследуемые вещества вводили перорально за 1 час до взятия образцов крови. Вначале определяли степень агрегации тромбоцитов здоровых животных. Терапевтическая доза препарата сравнения АСК вначале была взята из литературных данных (Dobrzyński M. et al., 2017; Puurunen J. et al., 1983; Guerrero A. et al., 2004; Ulucan C. et al., 2003) и составила 20 мг/кг. Для определения терапевтического эффекта соединений-лидеров первую дозу брали в эквимолярном соотношении от минимальной дозы АСК, вторую дозу рассчитывали эквимолярно от терапевтической дозы АСК, последующие дозы увеличивали на 10 и 20 мг, затем строили график зависимости доза-эффекта и определили терапевтический индекс. Установленные дозы соединений, которые использовали в дальнейших экспериментах, составили – АСК – 39 мг/кг; С-10 – 83 мг/кг; С-24 – 105 мг/кг; С-60 – 19 мг/кг; С-61 – 23 мг/кг.

Рисунок 2. Оценка антиагрегантного действия соединений производных гидроксibenзойных кислот с ГАМК, глицином, морфолином или таурином

*Примечание: А – гидроксibenзойные кислоты + ГАМК; Б – гидроксibenзойные кислоты + глицин; скобками обозначены сравниваемые группы; В – гидроксibenзойные кислоты + морфолин; Г – гидроксibenзойные кислоты + таурин; скобками обозначены сравниваемые группы; * – различия статистически значимы по критерию Данна при $p < 0,05$.*

На следующем этапе произвели оценку антиагрегантной активности соединений на модели артериального тромбоза, вызванного нанесением 50% раствора $FeCl_3$ на сонную артерию крыс (Рисунок 3) и на моделис электрическим током (Рисунок 4).

В ходе выполненных экспериментов по определению и оценке антиагрегантной и антитромботической активности 14 новых производных гидроксibenзойных кислот *in vitro* и *in vivo* было выделено 4 наиболее активных соединений. Для них проявили

был произведен расчет терапевтического индекса и оценка острой суточной токсичности.

В исследованиях антитромботической активности соединения под лабораторными шифрами С-60 и С-61 проявляли выраженный эффект, который отсутствовал у соединений С-10 и С-14.

Рисунок 3. Влияние соединений на тромбообразование в сонной артерии крыс после нанесения на неё раствора 50% FeCl₃

А – время полной окклюзии сосудов под влиянием исследуемых соединений, АСК и плацебо; *Б* – динамика тромбообразования под влиянием исследуемых соединений, АСК и плацебо; *В* – динамика тромбообразования под влиянием соединения С-10; *Г* – динамика тромбообразования под влиянием соединения С-24; *Д* – динамика тромбообразования под влиянием соединения С-60; *Е* – динамика тромбообразования под влиянием соединения С-61 * – $p < 0,05$ изменения статистически значимы по отношению к контролю критерий Стьюдента с поправкой Бонферрони.

Рисунок 4. Влияние соединений на тромбообразование в сонной артерии крыс, вызванного электрическим током

*Примечание: А – время полной окклюзии сосудов под влиянием соединений, АСК и плацебо; Б – динамика тромбообразования под влиянием соединений, АСК и плацебо; В – динамика тромбообразования под влиянием соединения С-10; Г – динамика тромбообразования под влиянием соединения С-24; Д – динамика тромбообразования под влиянием соединения С-60; Е – динамика тромбообразования под влиянием соединения С-61 * – $p < 0,05$ изменения статистически значимы по отношению к контролю критерий Стьюдента с поправкой Бонферрони.*

В четвертой главе описаны результаты антиагрегантного и антитромботического исследования у животных с преморбидным фоном (естественное старение, СД).

Для соединений С-60 и С-61 была выявлена высокая антиагрегантная активность, а у соединений С-10 и С-24 низкая, на основании этого было принято решение, исключить эти соединений.

Изучение влияния соединений на процесс тромбообразования, вызванного раствор FeCl_3 , выявлена высокая

антитромботическая активность исследуемых соединений на животных с преморбидным фоном.

В результате изучения влияния соединений на продолжительность кровотока из хвостовой вены наблюдалось статистически значимое увеличение данного времени у животных всех экспериментальных групп. У животных, которым вводили С-60, продолжительность образования тромба была на 26% меньше, чем у тех, которым вводили АСК. Данные результаты указывают на целесообразность проведения дальнейших исследований церебро- и эндотелиопротективных свойств этого соединения.

В пятой главе описаны результаты церебропротективного действия соединения С-60 на моделях: необратимой перевязки ОСА; интравазальной окклюзии левой средней мозговой артерии и ХНМК.

Выполненное исследование показало, что соединение С-60, оказывает выраженное церебропротективное действие в условиях острых (ООСА или ОСМА) и хронического (стенотоз ОСА) нарушений МК. Соединения С-60 на уровне препаратов – Цитиколин, Ницерголин или АСК снижает тяжесть психоневрологических последствий ишемии головного мозга, способствует меньшему падению уровня ЛМК и менее выраженной эндотелиальной дисфункции.

В шестой главе отражены результаты поэтапного моделирования ХНМК методом билатеральной ООСА. Вначале выполняли необратимую ООСА левой сонной артерии, а через год – правой, после чего у животных провели: 1. оценку поведения животных в стандартных психофармакологических тестах; 2. оценку сосудисто-тромбоцитарного и коагуляционного гемостаза; 3. оценку эндотелийзависимых реакций пилальных сосудов.

Курсовое 7-дневное введение соединения С-60 оказывает выраженное церебропротективное действие, повышает эндотелийзависимую вазодилатацию мозговых сосудов, улучшает поведенческую активность и снижает тяжесть психоневрологических нарушений у животных с ХНМК,

положительно влияет на показатели тромбоцитарного и коагуляционного гемостаза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные комплексные исследования позволили оценить антиагрегантный и антитромботический, церебро- и эндотелиопротективный эффекты в условиях приближенных к реальным клиническим случаям. Современные методики синтеза новых соединений помогают модернизировать структуру молекулы, изменить её физические и химические, а также улучшить фармакологические свойства, уменьшить эффективную дозу и побочные эффекты.

ВЫВОДЫ

1. Среди 14 производных гидроксibenзойных кислот, для которых проводили исследование антиагрегантной активности *in vitro* в диапазоне концентраций 10^{-4} до 10^{-8} М, эффектом обладали производное ГАМК – С-18, производные с глицином – С-9, С-10, С-24, С-40, производные с морфолином – С-16, С-18 и производные с таурином – С-56, С-58, С-59, С-60, С-61.
2. Наиболее выраженный антиагрегантный эффект проявляют натриевая соль и наличие ацетильного радикала в положении 4 (С-10), дикалиевая соль в положении 2 (С-24) с аминокислотой глицин и дикалиевые соли производных с таурином в положении 3 (С-60) и 4 (С-61).
3. Эффективная доза соединений составила С-10 – 83 мг/кг, С-24 – 105 мг/кг, С-60 – 19 мг/кг, С-61 – 23мг/кг; ЛД50 составила С-10 – 2920,24 мг/кг ($2793,94 \div 3048,54$), С-24 – 3519,87 мг/кг ($3407,60 \div 3632,14$), С-60 – 2209,98 мг/кг ($2209,98 \div 3232,81$), С-61 – 2441,22 мг/кг ($2158,82 \div 2760,57$).
4. Соединения С-60 или С-61, по сравнению с плацебо, пролонгировали время окклюзии сонной артерии на 73% ($p < 0,05$) и 68% ($p < 0,05$) на модели артериального тромбоза индуцированного $FeCl_3$, и на 72% ($p < 0,05$) и 76% ($p < 0,05$) – на модели тромбоза, вызванного электрическим током.
5. У животных с преморбидным фоном (старение или ЭСД), которым вводили С-60 или С-61, степень агрегации

тромбоцитов была меньше на 13-15% ($p < 0,05$) и на 13-18% ($p < 0,05$) соответственно ниже, чем у тех, которым вводили плацебо, при этом оказываемый эффект был сопоставим с АСК.

6. После введения соединений С-60 и С-61 время образования тромба у животных с преморбидным фоном (старение или ЭСД) увеличивалось на 25% ($p < 0,05$) или 10% ($p < 0,05$) и на 78% ($p < 0,05$) или 50% ($p < 0,05$), соответственно. Продолжительность кровотечения после введения С-60 уменьшалась на 26% ($p < 0,05$), по сравнению с показателями животных, которым вводили АСК.

7. У животных с острым или хроническим нарушением мозгового кровообращения, которым вводили соединение С-60, двигательная активность, координация движений, мышечный тонус и состояние эндотелиальной функции были значительно лучше, чем у тех, которым вводили плацебо, что свидетельствует о дополнительном церебропротективном и эндотелиопозитивном действии указанного соединения.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Целесообразно продолжить синтез и дальнейший поиск соединений с антиагрегантным и антитромботическими эффектами в ряду производных гидроксibenзойных кислот, имеющих в своем составе остаток сульфокислоты таурина.

2. Соединение С-60 дикалиевая соль N-(3-гидроксibenзоил)таурина является перспективным соединением для дальнейшего доклинического изучения с целью разработки на его основе нового оригинального лекарственного средства с антиагрегантной активностью.

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ

Статьи в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных Минобрнауки РФ

1. Родина Н.В., Брель А.К., Лисина С.В., Будаева Ю.Н. Синтез и психотропная активность солей N-(4-гидроксibenзоил)глицина и N-(4-ацетоксibenзоил)глицина // **Фундаментальные исследования**– 2013. – Т. 10. №9. – С.1963-1967.

2. **Родина Н.В.**, Брель А.К., Лисина С.В., Будаева Ю.Н. Соли карбоксилированных оксibenзамидов как потенциальные лекарственные препараты // **Вестник волгоградского государственного медицинского университета.** – 2014 – №5. С.16-17.

3. **Атапина Н.В.**, Арсланбекова В.А., Верхоляк Д.В., Куркин Д. В., Бакулин Д.А., Брель А.К., Лисина С.В. Церебропротекторная активность производного гидроксibenзойной кислоты – соединения с-38 на модели окклюзии общих сонных артерий у крыс // **Вестник волгоградского государственного медицинского университета.** – 2017 – Т.4. №64. С.54-57.

4. **Атапина Н.В.**, Брель А.К., Тюренков И.Н., Лисина С.В., Попов С.С., Верхоляк Д.В., Будаева Ю.Н., Волотова Е.В., Куркин Д.В. ацетоксибензоилглицилглицины как потенциальные церебропротекторные препараты // **Химико-фармацевтический журнал.** – 2018. – Т.52. №1. – С.15-18.

5. **Атапина Н.В.**, Брель А.К., Будаева Ю.Н., Лисина С.В., Царук С.С., Куркин Д.В., Тюренков И.Н. Синтез, антиагрегационная и антиромботическая активности новых производных гидроксibenзойных кислот с тауриновым фрагментом // **Фармация и фармакология.** – 2021.- Т.9. №3. – С.222-234.

Патенты на изобретение

1. **Атапина Н. В.**, Брель А. К., Тюренков И. Н., Лисина С. В., Куркин Д. В., Будаева Ю. Н., Волотова Е. В. Дикалиевая соль N-(3-гидроксibenзоил)таурина, обладающая антиагрегантной и антиромботической активностью в сочетании с церебропротективным действием. Патент на изобретение RUS 2730835 C1 26.08.2020

2. **Атапина Н. В.**, Брель А. К., Тюренков И. Н., Лисина С. В., Куркин Д. В., Будаева Ю. Н., Волотова Е. В. Дикалиевая соль N-(4-гидроксibenзоил)таурина, обладающая антиагрегантной и антиромботической активностью в сочетании с церебропротективным действием. RUS 2731106 C1 28.08.2020

Статьи в журналах и сборниках материалов конференций:

1. **Атапина Н.В.**, Верхоляк Д.В., Лисина С.В., Волотова Е. В. Изучение влияния новой соли амида гидроксibenзойной кислоты на выживаемость животных при экспериментальной ишемии головного мозга // В сборнике: 73-й международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов. – 2015 – С.316-317

2. **Атапина Н.В.**, Горина С.С., Брель А.К., Тюренков И. Н. Антитромботическое действие N-(4-ацетоксибензоил)глицината калия // В сборнике: 75-й международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов. – 2017 – С.417-419.

3. **Атапина Н.В.**, Волотова Е.В., Гуторова А.Н., Юрченко О.А. Влияние N-(4-ацетоксибензоил) глицината калия на АДФ-индуцированную агрегацию тромбоцитов крыс *in vitro* // В сборнике: 75-й международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов. – 2017 – С.616-617.

4. **Атапина Н.В.**, Куркин Д.В., Брель А.К. Оценка антитромботической и церебропротективной активности новых производных гидроксibenзойных кислот с таурином // XXIV региональная конференция молодых ученых и исследователей волгоградской области. – 2019 – С.92-93.

5. **Атапина Н.В.**, Куркин Д.В., Гуторова А.Н. Антитромботическое действие производных гидроксibenзойных кислот с таурином на модели артериального тромбоза // XXIV региональная конференция молодых ученых и исследователей волгоградской области – 2019 – С. 113-114.

6. **Атапина Н.В.**, Куркин Д.В., Будаева Ю.Н., Гуторова А.Н., Семенцова Е.Г. Антитромботическое влияние производных гидроксibenзойных кислот с аминокислотами на модели артериального тромбоза индуцированного аппликацией сонной артерии крыс 50% раствором хлорида железа (III) // В сборнике: 77-й международной научно-

практической конференции молодых ученых и студентов – 2019 – С. 504.

7. **Атапина Н.В.**, Куркин Д.В., Ложкова В.А. Оценка антиагрегантной активности новых производных оксibenзойных кислот // В сборнике: 77-й международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов – 2019 – С. 506.

8. **Атапина Н.В.**, Куркин Д.В., Царук С.С. Антитромботическая активность новых производных гидроксibenзойных кислот // В сборнике: 78-й международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов. – 2020 – С. 47-48.

9. **Атапина Н.В.**, Куркин Д.В., Царук С.С. Влияние новых производных ацетилсалициловой кислоты на простаглицин-синтезирующую активность эндотелия сосудов в постишемический период в эксперименте // XXV региональная конференция молодых учёных и исследователей волгоградской области – 2021 – С.201-203.

10. **Атапина Н.В.**, Куркин Д.В., Будаева Ю.Н., Гуторова А.Н., Никулина Н.А. Оценка эффективной дозы производных гидроксibenзойных кислот с аминокислотами. // В сборнике: 78-й международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов. – 2020 – С. 247-248.

11. **Атапина Н.В.**, Куркин Д.В., Брель А.К. Цецера Д.Э., Завадская В.Е., Тимошенко А.В. Место ацетилсалициловой кислоты в современной медицине // В сборнике: 79-й международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов – 2021 – С. 339

12. **Атапина Н.В.**, Куркин Д.В., Пустынников В.Э., Царук С.С. Влияние нового производного гидроксibenзойной кислоты на простаглицин-синтезирующую активность эндотелия сосудов в постишемический период в эксперименте // В сборнике: 79-й международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов – 2021 – С. 357-358.

13. **Атапина Н.В.,** Пустынников В.Э., Брель А.К., Будаева Ю.Н. Влияние дикалиевых солей бензоил таурина на простаглицлин-киназную активность и коагуляционный гемостаз пилальных сосудов // MEDCHEM-RUSSIA 2021 – 2021 – С. 269.

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

L-NAME – метиловый эфир N-нитро-L-аргинина;
 NO – оксид азота;
 vWF – фактор фон Виллебранда;
 АК – аминокислота;
 АСК – ацетилсалициловая кислота;
 АХ – ацетилхолин;
 ГАМК – гамма-аминомасляная кислота
 ГМФ – гуанозинмонофосфат;
 ГП – гликопротеины;
 ИБС – ишемическая болезнь сердца;
 ИИ – ишемический инсульт;
 ЛМК – локальный мозговой кровоток;
 ЛПНП – липопротеины низкой плотности;
 МК – мозговой кровоток;
 НМК – нарушение мозгового кровообращения;
 ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения
 ООСА – окклюзия общих сонных артерий;
 ОСА – общие сонные артерии;
 ОСМА – окклюзия средней мозговой артерии;
 ПВ – протромбиновое время;
 СД – сахарный диабет;

СД2 – сахарный диабет 2 типа;
 ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания;
 ТХА2 – тромбоксан А2;
 ТВ – тромбиновое время;
 ТИА – транзиторная ишемическая атака;
 ТФ – тканевой фактор, фактор свёртывания крови III;
 ФДЭ – фосфодиэстераза;
 ХНМК – хроническое нарушение мозгового кровообращения;
 цАМФ – циклический аденозинмонофосфат;
 цГМФ – циклический гуанозинмонофосфат;
 ЦОГ-1 – циклооксигеназа 1 типа;
 ЦОГ-2 – циклооксигеназа 2 типа;
 ЭД – эндотелиальная дисфункция;
 ЭК – эндотелиальные клетки;
 ЭСД – экспериментальный сахарный диабет.

АТАПИНА НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА

**АНТИАГРЕГАНТНАЯ, АНТИТРОМБОТИЧЕСКАЯ И
ЦЕРЕБРОПРОТЕКТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ НОВЫХ
ПРОИЗВОДНЫХ ГИДРОКСИБЕНЗОЙНЫХ КИСЛОТ**

3.3.6. Фармакология, клиническая фармакология

АВТОРЕФЕРАТ

Диссертации на соискание ученой степени

кандидата фармацевтических наук

Подписано в печать ____ . ____ 2022 г.

Формат 60x84/16. Бумага офсетная. Печать трафаретная.

Печ. л.1,0. Тираж 100 экз. Заказ № ____.

Издательство Волгоградского государственного технического
университета. 400005, г. Волгоград, просп. им. В.И. Ленина,
28, корп. №7.